

КАРТОЧКА-ПАМЯТКА ДЛЯ

ПАЦИЕНТА

Дабигатран ПСК (МНН: дабигатрана этексилат)

Данная карточка-памятка содержит важную информацию о безопасности, о которой Вам необходимо знать перед началом приёма лекарственного препарата (ЛП) Дабигатран ПСК, капсулы 75 мг, 110 мг, 150 мг, и во время лечения.

Храните эту памятку при себе и показывайте ее любому специалисту системы здравоохранения, участвующему в вашем лечении.

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по
медицинскому применению препарата
Дабигатран ПСК на сайте grls.rosminzdrav.ru
(Государственный реестр лекарственных
средств) для получения дополнительной
информации

Если у Вас остались какие-либо вопросы,
проконсультируйтесь с врачом или другим
медицинским работником

✓ ЛП Дабигатран ПСК предотвращает образование опасных тромбов.

✓ Следует принимать данный препарат только в соответствии с указаниями лечащего врача. Не следует прекращать прием препарата, не проконсультировавшись с лечащим врачом.

✓ Следует проконсультироваться с лечащим врачом перед приемом всех препаратов, в том числе биологически активных добавок, витаминов и препаратов, которые отпускаются по рецепту и без рецепта.

✓ Если Вам предстоит хирургическая операция или инвазивные вмешательства, необходимо до проведения процедуры сообщить врачу (в том числе и стоматологу) о том, что Вы принимаете ЛП Дабигатран ПСК.

✓ ЛП Дабигатран ПСК можно принимать независимо от времени приема пищи. Капсулу следует глотать целиком, запивая стаканом воды, чтобы обеспечить попадание препарата в желудок. Не разламывайте, не разжевывайте и не вынимайте пеллеты (содержимое капсулы, твердые шарообразные частицы, состоящие из лекарственного вещества и вспомогательных веществ) из капсулы, поскольку это может увеличить риск развития кровотечения.

✓ Если Вы забыли принять препарат, просто примите следующую запланированную дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу с целью

компенсации пропущенной дозы.

✓ Если Вы принимаете нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен, диклофенак, кеторолак), проконсультируйтесь с лечащим врачом, так как они могут значительно повысить у Вас риск кровотечения.

✓ Обратите внимание на следующие факторы риска, повышающие риск кровотечения: возраст старше 75 лет, значительные кровотечения в прошлом, нарушение функции почек, печени, желудка (эзофагит или гастрит), прием препаратов, влияющих на свертываемость крови (аспирин или другие антикоагулянты).

Для получения полной информации о препарате следует ознакомиться с листком-вкладышем.

**Следует немедленно обратиться к врачу в
следующих случаях:**

✓ если у Вас появился какой-либо из следующих признаков или симптомов, свидетельствующих о кровотечении: отек, неприятные ощущения, необъяснимые боли или головные боли, головокружение, бледность, слабость, необычные гематомы, носовые кровотечения, кровотечения из десен, длительные и необычные кровотечения из порезов на коже, необычные менструальные кровотечения или вагинальные кровотечения, кровь в моче (может быть красного или коричневого цвета), красный или черный стул, кашель с кровью, кровавая рвота или рвота в виде кофейной гущи.

✓ Если Вы упали или поранились в период, когда получаете препарат (в особенности, если Вы ударились головой), следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

*Не следует прекращать прием препарата, не
проконсультировавшись с лечащим врачом.*

Лечащему врачу следует заполнить следующие данные:

<i>Имя и фамилия пациента</i>	
<i>Дата рождения</i>	____ _ Дата месяц год
<i>Группа крови</i>	
<i>Цели лечения (обозначьте в соответствующем квадрате)</i>	<input type="checkbox"/> Профилактика инсульта <input type="checkbox"/> Профилактика венозной тромбоэмболии после ортопедической операции <input type="checkbox"/> Лечение тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии и профилактика их рецидива
<i>Дозировка и время приема</i>	
<i>Функция почек в начале приема препарата: (клиренс креатинина мл/мин)</i>	
<i>Дата начала лечения</i>	____ _ ____ _ Дата месяц год
<i>Имя и фамилия лечащего врача</i>	
<i>Телефон лечащего врача</i>	

При обращении за медицинской помощью, включая экстренные случаи, следует сообщить медицинскому персоналу о том, что пациент получает Дабигатран ПСК.

Заполните данные контактного лица, для того, чтобы связаться в экстренных ситуациях:

<i>Имя, фамилия</i>	
<i>Номер мобильного телефона</i>	

Если Вы наблюдаете у себя развитие нежелательных реакций, сообщите об этом лечащему врачу, фармацевту или другому медицинскому работнику

О развитии нежелательных реакций Вы так же можете сообщить в компанию ООО «ПСК Фарма» по:

- электронной почте pv@rusbiopharm.ru,
- телефону горячей линии по эффективности и безопасности (24 часа) 8 (800) 234-16-99.

Сообщайте о развитии любой нежелательной реакции, даже если она не указана в инструкции по медицинскому применению препарата Дабигатран ПСК