

Что Вы должны знать о препарате Редитукс® (ритуксимаб)

Важная информация по безопасности для пациентов (или родителей/законных представителей несовершеннолетних пациентов)

- Настоящая брошюра содержит только важную информацию по безопасности.
- Более подробная информация о побочных эффектах препарата Редитукс® (ритуксимаб) приведена в инструкции по медицинскому применению.

Данный обучающий материал предоставлен компанией Д-р Редди'с Лабораторис Лтд. и является обязательным условием обращения лекарственного препарата Редитукс® (ритуксимаб). Цель данного обучающего материала - дополнительно снизить некоторые важные риски, связанные с препаратом.

Об этой брошюре

Информация в этой брошюре предназначена для пациентов (или родителей/законных представителей несовершеннолетних пациентов), получающих препарат Реддитукс® (ритуксимаб). Пожалуйста, внимательно прочитайте данную брошюру - Вам необходимо понимать пользу и риски терапии препаратом Реддитукс® (ритуксимаб).

Настоящая брошюра:

- ответит на Ваши возможные вопросы о потенциальных рисках при применении препарата Реддитукс® (ритуксимаб) - это поможет Вам и Вашему врачу решить, подходит ли Вам такое лечение;
- расскажет о препарате Реддитукс® (ритуксимаб);
- расскажет, что необходимо знать перед началом применения препарата Реддитукс® (ритуксимаб);
- расскажет о важных побочных эффектах, которые Вам следует знать, включая редкую, но серьезную инфекцию головного мозга, называемую «Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия», или ПМЛ;
- расскажет о возможных признаках инфекции и ПМЛ;
- расскажет, что нужно делать при подозрении на инфекцию или ПМЛ;
- расскажет о Памятке для пациента.

Что нужно знать о препарате Реддитукс® (ритуксимаб)

О препарате

Препарат Реддитукс® (ритуксимаб) влияет на иммунную систему и может повышать вероятность возникновения инфекции. Некоторые инфекции могут быть серьезными и могут требовать лечения.

О применении ритуксимаба

Препарат Реддитукс® (ритуксимаб) вводят путем внутривенной инфузии.

Как и все лекарственные средства, препарат Реддитукс® (ритуксимаб) может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех пациентов и большинство побочных эффектов не носит серьезного характера.

- Если Вы получаете препарат Реддитукс® (ритуксимаб) на фоне применения других лекарственных препаратов, некоторые побочные эффекты могут быть вызваны другими лекарственными препаратами.
- Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными и могут потребовать терапии. В редких случаях некоторые побочные эффекты могут угрожать жизни.

Если какой-либо побочный эффект становится серьезным, немедленно сообщите об этом своему врачу или медсестре.

Если у Вас появляются какие-либо вопросы, свяжитесь со своим врачом или медсестрой.

Держите при себе список всех лекарственных средств, которые Вы принимаете, и показывайте его всем, кто оказывает Вам медицинскую помощь, например, врачу, медсестре или стоматологу.

Перед началом применения препарата Реддитукс® (ритуксимаб)

Перед началом применения препарата Реддитукс® (ритуксимаб) сообщите своему врачу и/или медсестре, если у Вас имеются или имелись:

Инфекции

Перед началом применения препарата Реддитукс® (ритуксимаб) сообщите своему врачу или медсестре, если:

- в настоящее время вы переносите инфекцию (даже легкую, такую как простуда/ОРВИ). Ваш врач или медсестра могут порекомендовать Вам подождать, пока инфекция пройдет, прежде чем получать препарат Реддитукс® (ритуксимаб);
- Вы часто болеете или часто болели в прошлом;
- у Вас имеются или имелись тяжелые инфекции, такие как туберкулез, заражение крови (сепсис) или любое другое состояние, которое ослабляет иммунную систему;
- у Вас имеется состояние, которое может повышать вероятность серьезной инфекции, требующей лечения.

Другие состояния

Перед началом применения препарата Реддитукс® (ритуксимаб) сообщите своему врачу или медсестре, если:

- у Вас имеется какое-либо сердечно-сосудистое заболевание;
- у Вас имеются какие-либо нарушения дыхания;
- Вы беременны, планируете беременность или кормите грудью;
- у Вас имеются или ранее имелись вирусный гепатит или любое другое заболевание печени;
- у Вас имеются какие-либо отклонения от нормы в показателях анализа крови или мочи.

Применение лекарственных средств

Перед началом применения препарата Реддитукс® (ритуксимаб) сообщите своему врачу или медсестре, если:

- Вы принимаете антигипертензивные средства;
- Вы принимаете или ранее принимали лекарственные средства, которые могут повлиять на иммунную систему, такие как средства, подавляющие иммунную систему, называемые иммуносупрессивными средствами, или проходили или проходите лечение онкологических заболеваний, называемое химиотерапией;
- Вы перенесли химиотерапию, влияющую на сердечную функцию (кардиотоксическая химиотерапия);
- Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты. Сюда также входят безрецептурные препараты, купленные самостоятельно.

Вакцинация

Перед началом применения препарата Реддитукс® (ритуксимаб) сообщите своему врачу или медсестре, если:

- недавно Вы прошли вакцинацию или думаете, что Вам может быть необходима вакцинация в ближайшем будущем, включая любые прививки, необходимые для поездки в другие страны.

Некоторые вакцины нельзя вводить одновременно с препаратом Реддитукс® (ритуксимаб) или в течение нескольких месяцев после введения препарата Реддитукс® (ритуксимаб). Ваш врач проверит, необходима ли Вам вакцинация перед применением препарата Реддитукс® (ритуксимаб). Если что-либо из вышперечисленного применимо к Вам, сообщите об этом своему врачу или медсестре. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим врачом или медсестрой до начала применения препарата Реддитукс® (ритуксимаб).

В ходе применения и после применения препарата Реддитукс® (ритуксимаб)

Препарат Реддитукс® (ритуксимаб) влияет на иммунную систему и может повышать вероятность возникновения инфекции. Некоторые инфекции могут быть серьезными и могут потребовать лечения.

Инфекции

Незамедлительно сообщите своему врачу или медсестре, если Вы замечаете что-либо из этих возможных признаков инфекции:

- повышение температуры тела (лихорадка) с ознобом или без него;
- кашель, который не проходит;
- снижение массы тела;
- боль в отсутствие травматизации;
- чувство общего недомогания, усталости или упадка сил;
- жгучая боль при мочеиспускании.

Незамедлительно сообщите своему врачу или медсестре, если Вы замечаете какие-либо из перечисленных выше признаков инфекции.

Серьезная инфекция головного мозга, называемая прогрессирующей многоочаговой лейкоэнцефалопатией (ПМЛ)

В редких случаях препарат Реддитукс® (ритуксимаб) может вызывать серьезную инфекцию головного мозга, называемую «Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия», или ПМЛ. Она может приводить к тяжелой инвалидизации, а также может представлять опасность для жизни. ПМЛ вызывает вирус, который у большинства здоровых людей остается неактивным и поэтому не наносит вреда. Неизвестно, почему у некоторых людей данный вирус активизируется, однако это может быть связано со слабой иммунной системой.

Немедленно сообщите своему врачу или медсестре, если у Вас появляются какие-либо из следующих признаков ПМЛ во время лечения или в течение 2 лет после получения последней дозы препарата Реддитукс® (ритуксимаб):

- спутанность сознания, потеря памяти или нарушение мышления;
- потеря равновесия, изменение походки или речи;
- слабость или потеря силы на одной стороне тела;
- нечеткость или потеря зрения.

Памятка для пациента

Памятка для пациента содержит важную информацию по безопасности, необходимую Вам до начала, в процессе и после окончания применения препарата Реддитукс® (ритуксимаб).

- Памятка для пациента вложена в упаковку лекарственного препарата. Вы должны получать Памятку для пациента при каждой инфузии препарата Реддитукс® (ритуксимаб).
- Всегда держите Памятку для пациента при себе - например, в кошельке или сумочке.
- Показывайте Памятку для пациента всем, кто оказывает Вам медицинскую помощь. К таким лицам относится врач, медсестра или стоматолог, которого Вы посещаете, а не только специалист, назначивший Вам препарат Реддитукс® (ритуксимаб).
- Расскажите о Вашем лечении партнеру или лицу, осуществляющему уход за Вами, и покажите ему Памятку для пациента. Люди из Вашего близкого окружения могут заметить побочные эффекты, о которых Вы могли не подозревать.
- Воздействие препарата Реддитукс® (ритуксимаб) на иммунную систему может продолжаться в течение нескольких месяцев, поэтому некоторые побочные эффекты могут возникать, даже если Вы больше не применяете препарат Реддитукс® (ритуксимаб). Поэтому важно держать при себе Памятку для пациента в течение как минимум 2 лет после получения последней дозы препарата Реддитукс® (ритуксимаб).