

ГЕДЕОН РИХТЕР

Здоровье — наша миссия

000 «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»

г. Москва, 119049, 4-й Добрынинский пер., д. 8. Тел.: +7 (495) 987-18-80, e-mail: GRFarma@g-richter.ru. Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) г. Москва: г. Москва, 119049, 4-й Добрынинский пер., д. 8. Тел.: +7 (495) 987-15-55, e-mail: centr@g-richter.ru, www.gedeonrichter.com/ru/ru.

Если вы хотите сообщить о нежелательной реакции, возникшей при применении **Рикулатрон** (ривароксабан), пожалуйста, передайте эту информацию в компанию Гедеон Рихтер Фарма



24/7 Тел.: 8-800-5555-9



E-mail: drugsafety@g-richter.ru

ПП-№(003000)-(PГ-RU) от 04.02.2025 KEDP/DAFRWS СПамятка для пациента принимающего ривароксабан (Рикулатрон) в дозе 2.5 мг, 10 мг, 15 мг или 20 мг по назначению врача Материал подготовлен в рамках мер минимизации рисков и не является рекламным материалом. Материал одобрен Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)



Что нужно знать о лекарственном препарате РИКУЛАТРОН ривароксабан •



Лекарственный препарат **Рикулатрон** разжижает кровь, препятствуя образованию опасных тромбов.



Рикулатрон следует принимать в строгом соответствии с указаниями вашего лечащего врача. Для достижения оптимальной защиты от образования тромбов никогда не пропускайте прием очередной дозы препарата.



Запрещается прекращать прием препарата Рикулатрон без предварительной консультации с лечащим врачом, поскольку может увеличиться риск образования тромбов.



Перед началом применения **Рикулатрона** сообщите врачу обо всех других лекарственных препаратах, которые вы принимаете в настоящее время, принимали недавно или планируете принимать.



Перед операцией или инвазивной процедурой сообщите вашему лечащему врачу о том, что вы принимаете лекарственный препарат **Рикулатрон.**

В каких случаях следует обращаться к лечащему врачу?

При применении препарата для разжижения крови, в том числе препарата Рикулатрон, важно обращать внимание на возможные нежелательные реакции.

Наиболее частой нежелательной реакцией является кровотечение. Не начинайте прием препарата **Рикулатрон** без предварительной консультации с лечащим врачом, если у вас повышен риск кровотечений.

Сразу же обратитесь к лечащему врачу при возникновении любых признаков и симптомов кровотечения, включая следующие:

- появление необычных синяков, носовые кровотечения, кровоточивость десен, длительное кровотечение после пореза:
- более обильная, чем обычно, менструация или влагалищное кровотечение;
- кровь в моче, при этом моча может быть розового или коричневого цвета;
- кашель с выделением крови (кровохарканье), рвота кровью или рвота, имеющая цвет кофейной гущи.
- боль;
- отечность или дискомфорт в мышцах и суставах;
- головная боль, головокружение или слабость.



Для достижения оптимальной защиты Рикулатрон:

- в дозировке 2,5 мг можно принимать независимо от приема пищи;
- в дозировке 10 мг можно принимать независимо от приема пищи;
- в дозировке 15 мг следует принимать во время приема пищи;
- в дозировке 20 мг следует принимать во время приема пищи.



2,5 мг

независимо от приема пищи



10 мг

независимо от приема пищи



15 и 20 мг

во время приема пищи



Информация для медицинских работников: не следует учитывать показатели МНО, так как они не отражают степень активности препарата Рикулатрон!

Я получаю антикоагулянтную терапию лекарственным препаратом Рикулатрон (ривароксабан)				
Рикулатрон	Рикулатрон	Рикулатрон	Рикулатрон	
2.5 мг	10 мг	15 мг	20 мг	
• Показывайте эту	гда носите с собой эту памятку. азывайте эту памятку при каждом обращении за медицинской помощью, м числе стоматологической.			
Дата рождения:		Масса	Масса тела:	
 Прием других препаратов (перечислить):		Сопутс	Сопутствующие заболевания:	
 				-
 Контактное лицо но неотложного состо (ФИО, кем приходи	яния	Номер	телефона:	-