

КАРТОЧКА-ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ ПРЕПАРАТ ОДОМЗО

Почему мне дали эту памятку?

Лекарственный препарат Одомзо, который Вы принимаете, может вызвать *серьезные врожденные дефекты развития у плода и привести к смерти ребенка до его рождения или вскоре после рождения.*

В этой памятке описаны рекомендации, которые следует соблюдать при приеме Одомзо, чтобы минимизировать данный риск.

Не принимайте этот лекарственный препарат, если Вы:

- ! Беременны или думаете, что можете быть беременны
- ! Кормите грудью или планируете кормить грудью
- ! Не используете меры контрацепции

Если Вы принимаете препарат Одомзо и ведете половую жизнь, то должны следовать этим рекомендациям:

1. Пациенты женского пола должны пройти тест на беременность в течение 7 дней до начала лечения препаратом Одомзо и ежемесячно во время лечения.
2. Использовать два метода контрацепции. Барьерный метод (мужской презерватив со спермицидом, если есть ИЛИ диафрагма со спермицидом) Высокоэффективный метод (Внутриматочная спираль ИЛИ трубная стерилизация, ИЛИ вазэктомия).

3. Если Вы женщина - Вам следует полностью отказаться от половой жизни ИЛИ применять 2 метода контрацепции в течение всего периода лечения и 20 месяцев после получения последней дозы.
4. Если Вы мужчина - Вы должны использовать меры контрацепции, даже если Вам проведена вазэктомия, в течение всего периода лечения и 6 месяцев после приема последней дозы.
5. Вы или Ваша партнерша не должны планировать беременность в течение всего периода лечения и 20 месяцев после его завершения, получая препарат Одомзо.
6. Сообщите своему лечащему врачу и прекратите прием препарата Одомзо, если:
 - Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели во время приема препарата Одомзо или в течение 20 месяцев после приема последней дозы.
 - Ваша партнерша беременна или кормит грудью во время Вашего лечения препаратом или в течение 6 месяцев после приема последней дозы.

После лечения:

1. Верните неиспользованные капсулы Одомзо в конце лечения врачу или фармацевту.
2. Не сдавайте кровь с целью донорства во время лечения и в течение 20 месяцев после получения последней дозы препарата.
3. Не сдавайте сперму с целью донорства во время лечения и в течение 6 месяцев после получения последней дозы препарата.

Не является промоциональным материалом.

Материал одобрен Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Если Вам стало известно о беременности, наступившей на фоне лечения препаратом Одомзо, или о любой иной нежелательной реакции на сонидегиб, пожалуйста, направьте эту информацию по адресу электронной почты: PV.EAEU@sunpharma.com.

Подробную информацию о безопасности см. на сайтах: <https://grls.rosminzdrav.ru/> и <https://portal.eaeunion.org/>