



ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

Ривароксабан Фармасинтез
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

- Постоянно носите данную памятку с собой
- Показывайте данную памятку всем врачам, в том числе стоматологам, перед началом лечения

Я получаю антикоагулянтную терапию лекарственным препаратом Ривароксабан Фармасинтез по назначению врача (нужное отметить):

2,5 мг 10 мг 15 мг 20 мг

ФИО: _____

Адрес: _____

Дата рождения: _____

Масса тела: _____

Другие препараты/ заболевания: _____

В экстренной ситуации следует сообщить:

ФИО врача: _____

Телефон врача: _____

Пожалуйста, также сообщите об экстренной ситуации:

ФИО: _____

Телефон: _____

Степень родства: _____

△ Информация для медицинских работников:

Не следует учитывать показатели МНО, поскольку они не отражают степень антикоагулянтной активности лекарственного препарата Ривароксабан Фармасинтез.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Что необходимо знать о препарате Ривароксабан Фармасинтез?

- Ривароксабан Фармасинтез снижает вязкость крови, предотвращая формирование опасных тромбов.
- Ривароксабан Фармасинтез следует принимать СТРОГО в соответствии с предписаниями врача. Чтобы обеспечить оптимальную защиту от тромбов, ни в коем случае не пропускайте дозу.
- Не рекомендуется прекращать прием препарата Ривароксабан Фармасинтез без предварительной консультации с врачом, поскольку это может повысить риск образования тромбов.
- Перед началом лечения препаратом Ривароксабан Фармасинтез, уведомите Вашего лечащего врача обо всех других лекарственных препаратах, которые Вы принимаете в настоящее время, принимали недавно или планируете принимать.
- Перед началом любой хирургической операции или инвазивного вмешательства сообщите врачу о том, что вы принимаете Ривароксабан Фармасинтез.

Как принимать препарат Ривароксабан Фармасинтез:

2,5 мг

независимо от приема пищи

10 мг

независимо от приема пищи

15 мг

во время еды

20 мг

во время еды

В каких случаях следует обращаться к лечащему врачу?

При применении препарата для разжижения крови, в том числе препарата Ривароксабан Фармасинтез, важно обращать внимание на возможные нежелательные реакции.

Наиболее частой нежелательной реакцией является кровотечение. Не начинайте прием препарата Ривароксабан Фармасинтез без предварительной консультации с лечащим врачом, если у вас повышен риск кровотечений. Сразу же обратитесь к лечащему врачу при возникновении любых признаков и симптомов кровотечения, включая следующие:

- появление необычных синяков, носовые кровотечения, кровоточивость десен, длительное кровотечение после пореза;
- более обильная, чем обычно, менструация или влагалищное кровотечение;
- кровь в моче, при этом моча может быть розового или коричневого цвета;
- кашель с выделением крови (кровохарканье), рвота кровью или рвота, имеющая цвет кофейной гущи;
- необъяснимая отечность или дискомфорт в мышцах и суставах (припухлость тканей или суставов, боль в суставах);
- головная боль, головокружение или слабость.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с врачом или другим медицинским работником

Если Вы наблюдаете развитие нежелательных реакций у Вас или у Вашего ребенка, сообщите об этом лечащему врачу, фармацевту или другому медицинскому работнику

Если Вы хотите сообщить о нежелательной реакции, возникшей при применении Ривароксабан Фармасинтез, пожалуйста, сообщите эту информацию в ООО «Фармасинтез-Тюмень» через любую из удобных для вас форм связи:

1. E-mail: info-pst@pharmasyntez.com
2. Телефон: 8-800-100-15-50
3. Заполнить форму на сайте: <https://pharmasyntez.com/>