



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

14.10.2026 № 01И-1223/26

На № _____ от _____

Об образовательных материалах
по безопасному применению
лекарственного препарата
Стимплейт® (ромиплостим)



Субъекты обращения
лекарственных средств

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств образовательный материал для специалистов системы здравоохранения и пациентов, разработанный АО «ГЕНЕРИУМ» в качестве дополнительных мер минимизации рисков, связанных с применением лекарственного препарата Стимплейт® (ромиплостим).

Приложение: Руководство для медицинских специалистов, пациентов/лиц, осуществляющих уход за пациентами, по подбору дозы, восстановлению и хранению лекарственного препарата Стимплейт® на 17 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

СТИМПЛЕЙТ® (РОМИПЛОСТИМ)

**РУКОВОДСТВО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ И
ПАЦИЕНТОВ/ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД ЗА
ПАЦИЕНТАМИ ПО ПОДБОРУ ДОЗЫ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ
И ХРАНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
СТИМПЛЕЙТ®**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕПАРАТ СТИМПЛЕЙТ®	3
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА СТИМПЛЕЙТ®	3
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ и РАЗВЕДЕНИЕ	3
ХРАНЕНИЕ	3
ВОССТАНОВЛЕНИЕ	4
РАЗВЕДЕНИЕ	4
КАК РАССЧИТАТЬ ДОЗУ ПРЕПАРАТА СТИМПЛЕЙТ®	5
КОРРЕКТИРОВКА ДОЗЫ	6
УКАЗАНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РАСТВОРА И ПРИМЕНЕНИЮ	7
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ	8
ЗАМЕТКИ	9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. КАЛЬКУЛЯТОР ДОЗЫ	9

Цель данного Руководства – упростить медицинским специалистам, пациентам, а также лицам, осуществляющим уход за пациентами процесс по расчету дозы, восстановлению и хранению лекарственного препарата Стимплейт®.

ПРЕПАРАТ СТИМПЛЕЙТ®

Препарат Стимплейт® (МНН: ромиплостим) представляет собой Fc-пептидильированный белок (пептидное антитело), участвующий в проведении сигнала и активации внутриклеточной транскрипции посредством связывания с рецепторами тромбопоэтина (ТПО) (также известный как c-Mpl) и индуцирующий увеличение образования тромбоцитов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА СТИМПЛЕЙТ®

Взрослые:

Препарат Стимплейт® показан для лечения первичной иммунной тромбоцитопении (ИТП) у взрослых пациентов, резистентных к другим видам лечения (например, глюкокортикостероидам, иммуноглобулинам).

Дети:

Препарат Стимплейт® показан для лечения хронической первичной иммунной тромбоцитопении (ИТП) у детей от одного года и старше, которые резистентны к другим видам лечения (например, глюкокортикостероидам, иммуноглобулинам).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ и РАЗВЕДЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

- Для восстановления лекарственного препарата Стимплейт® следует использовать только стерильную воду для инъекций.
- Не использовать натрия хлорид или бактериостатическую воду для восстановления препарата Стимплейт®.
- Стимплейт® выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения по 250 мкг (500 мкг/мл) и 500 мкг (500 мкг/мл) действующего вещества во флаконе.
- Хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 °C в оригинальной упаковке (пачке картонной) для защиты от света. Не замораживать!
- Препарат может храниться вне холодильника в течение 30 дней при температуре не выше 25°C в оригинальной упаковке (пачке картонной).
- После восстановления хранить в течение 24 часов при температуре 25 °C или в течение 24 часов в холодильнике при температуре от 2 до 8 °C в оригинальной упаковке (пачке картонной) для защиты от света.
- Восстановленный препарат следует хранить в защищенном от света месте.

- Неиспользованный препарат или отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными требованиями.
- Стимплейт® представляет собой белок, поэтому флакон **НЕ СЛЕДУЕТ ВСТРЯХИВАТЬ ИЛИ ЭНЕРГИЧНО ПЕРЕМЕШИВАТЬ** во время растворения.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Для восстановления лекарственного препарата должна применяться только стерильная вода для инъекций. **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ** натрия хлорид или бактериостатическую воду для восстановления препарата Стимплейт®.

1. Стимплейт® следует восстанавливать в соответствии с надлежащими правилами асептики.
2. Воду для инъекций следует вводить во флакон.
3. Флакон можно осторожно перевернуть для растворения содержимого. Флакон не следует встряхивать или энергично перемешивать его содержимое. Обычно растворение препарата Стимплейт® занимает менее 2 минут.
4. Перед применением следует визуально убедиться в отсутствии посторонних частиц и нарушении цвета раствора.
 - Готовый раствор должен быть прозрачным и бесцветным. Готовый раствор не должен применяться в случае наличия посторонних частиц и/или окраски.
 - Неиспользованный препарат или отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными требованиями.

Содержимое флакона

Флакон препарата Стимплейт® для однократного применения	Общее содержание ромиплостима во флаконе	Объем стерильной воды для инъекций	Доставляемое количество и объем	Финальная концентрация
250 мкг	375 мкг	0,72 мл	250 мкг в 0,50 мл	500 мкг/мл
	+	=		
500 мкг	625 мкг	1,25 мл	500 мкг в 1,0 мл	500 мкг/мл

РАЗВЕДЕНИЕ

Разведение (требуется, когда рассчитанная индивидуальная доза для пациента составляет менее 23 мкг):

Для разведения должен применяться только стерильный раствор натрия хлорида 9 мг/мл (0,9%) без консервантов. Для разведения **НЕ СЛЕДУЕТ** применять декстрозу (5%) в воде или стерильную воду для инъекций.

После первоначального восстановления ромиплостима с помощью необходимого объема стерильной воды для инъекций концентрация препарата составляет 500 мкг/мл (см. таблицу «Содержимое флакона» на предыдущей странице). Если рассчитанная индивидуальная доза

для пациента составляет мене 23 мкг, то для получения точного объема необходимо дополнительное разведение до концентрации 125 мкг/мл с помощью **стерильного раствора натрия хлорида 9 мг/мл (0,9%) без консервантов** (см. таблицу ниже).

Руководство по разведению

Стимплейт® во флаконе для однократного применения	Добавляют данный объем стерильного раствора натрия хлорида 9 мг/мл (0,9%) без консервантов	Концентрация после разведения
250 мкг	2,25 мл	125 мкг/мл
500 мкг	3,75 мл	125 мкг/мл

Для расчета общего объема инъекции, подлежащего введению после разведения, обратитесь к Калькулятору дозы (Приложение 1).

Хранение восстановленного и разведенного препарата Стимплейт®

После восстановления: химическая и физическая стабильность разведенного препарата сохраняются в течение 24 часов при температуре 25 °С и в течение 24 часов при температуре 2 – 8 °С в защищенном от света месте и в **оригинальной упаковке**. С микробиологической точки зрения препарат следует использовать немедленно. Если немедленного применения не последовало, сроки и условия хранения восстановленного препарата перед использованием остаются на ответственности потребителя и не должны превышать 24 часа при температуре 25 °С или 24 часа в холодильнике (при температуре 2 – 8 °С), препарат следует хранить в защищенном от света месте.

После разведения: химическая и физическая стабильность при применении была продемонстрирована в течение 4 часов при температуре 25 °С, когда разведенный препарат хранился в одноразовом шприце, или в течение 4 часов в холодильнике (2 – 8 °С), когда разведенный препарат хранился в оригинальном флаконе.

С микробиологической точки зрения разведенный лекарственный препарат следует использовать немедленно. Если немедленного применения не последовало, сроки и условия хранения разведенного препарата перед использованием остаются на ответственности потребителя и не должны превышать 4 часа при температуре 25 °С, или 4 часа в холодильнике (2 – 8 °С), препарат следует хранить в защищенном от света месте.

КАК РАССЧИТАТЬ ДОЗУ ПРЕПАРАТА СТИМПЛЕЙТ®

Расчет начальной дозы:

1. Начальная доза ромиплостима составляет 1 мкг/кг фактической массы тела на начало терапии.
2. Определите массу тела пациента в килограммах
3. Для использования калькулятора нет необходимости определять индивидуальную дозу пациента

4. Обратитесь к ячейке Калькулятора Дозы для определения общего объема инъекции, исходя из массы тела пациента в килограммах и дозы в мкг/кг.

Последующие дозы:

1. Определите количество тромбоцитов у пациента и дозу препарата, вводимую на предыдущей неделе.
2. Обратитесь к таблице по корректировке дозы, чтобы определить, как следует скорректировать дозу в мкг/кг, в зависимости от количества тромбоцитов.
3. У пациентов детского возраста дозу корректируют в дальнейшем в зависимости от количества тромбоцитов и с учетом изменения массы тела. Массу тела рекомендуется повторно измерять каждые 12 недель.
4. Обратитесь к ячейке Доза в Калькуляторе дозы (Приложение 1) для определения общего объема инъекции, исходя из массы тела пациента в килограммах и дозы в мкг/кг.
5. Количество тромбоцитов следует оценивать еженедельно до тех пор, пока не будет достигнуто стабильное количество ($\geq 50 \times 10^9/\text{л}$ в течении не менее 4 недель без коррекции дозы). В дальнейшем следует ежемесячно оценивать количество тромбоцитов и проводить корректировки дозы в соответствии с таблицей корректировки дозы (стр. 8), чтобы поддерживать количество тромбоцитов в рекомендуемом диапазоне.

КОРРЕКТИРОВКА ДОЗЫ

Корректировка дозы в зависимости от количества тромбоцитов:

Количество тромбоцитов ($\times 10^9/\text{л}$)	Действия
< 50	Увеличить однократную еженедельную дозу на 1 мкг/кг
> 150 в течение 2 недель подряд	Уменьшить однократную еженедельную дозу на 1 мкг/кг
> 250	Не назначать пациенту препарата, продолжать еженедельно оценивать количество тромбоцитов После того как количество тромбоцитов снизится до $< 150 \times 10^9/\text{л}$, продолжить лечение еженедельной дозой, сниженной на 1 мкг/кг

В зависимости от индивидуальной особенности ответа тромбоцитов, у некоторых пациентов после снижения дозы или прекращения лечения количество тромбоцитов может резко снизиться ниже $150 \times 10^9/\text{л}$. В таких случаях, если клинически целесообразно, в соответствии с медицинским заключением могут рассматриваться более высокие уровни количества тромбоцитов для снижения дозы ($200 \times 10^9/\text{л}$) и прекращения лечения ($400 \times 10^9/\text{л}$).

Не следует превышать максимальную еженедельную дозу 10 мкг/кг.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РАСТВОРА И ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Стимплейт® - высокоактивный белок, предназначенный для подкожного введения в малых дозах. Стимплейт® выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения путем восстановления стерильной водой для инъекций.
- ✓ Стимплейт® зарегистрирован в двух дозировках 250 и 500 мкг в одном флаконе. После восстановления в соответствии с указаниями, концентрация ромиплостима во флаконе составляет 500 мкг/мл.
- ✓ Стимплейт® 500 мкг, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для подкожного введения, следует восстанавливать в 1,25 мл стерильной воды для инъекций для получения объема 1,0 мл. Каждый флакон содержит избыточное количество раствора, чтобы обеспечить введение 500 мкг ромиплостима (см. содержимое флакона в таблице ниже).
- ✓ Стимплейт® 250 мкг, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для подкожного введения, следует восстанавливать в 0,72 мл стерильной воды для инъекций для получения объема 0,5 мл. Каждый флакон содержит избыточное количество раствора, чтобы обеспечить введение 250 мкг ромиплостима (см. содержимое флакона в таблице ниже).

Содержимое флакона

Флакон препарата Стимплейт® для однократного применения	Общее содержание ромиплостима во флаконе	Объем стерильной воды для инъекций	Доставляемое количество и объем	Финальная концентрация
250 мкг	375 мкг	0,72 мл	250 мкг в 0,50 мл	500 мкг/мл
		+	=	
500 мкг	625 мкг	1,25 мл	500 мкг в 1,0 мл	500 мкг/мл

- ✓ Меньшие количества препарата Стимплейт® могут потребоваться пациентам, для которых приемлемы низкие еженедельные дозы, а также в ходе фазы титрования.
- ✓ Стимплейт® следует вводить один раз в неделю в виде подкожной инъекции. Дозу корректируют, исходя из изменения количества тромбоцитов и с учетом изменения массы тела.
- ✓ Объем инъекции может быть очень небольшим. Следует использовать шприц с градуировкой 0,01 мл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сообщения о предполагаемых нежелательных реакциях

Предоставление сообщений о предполагаемых нежелательных реакциях имеет важное значение после получения регистрационного удостоверения на лекарственный препарат.

Это позволяет продолжить мониторинг соотношения пользы и рисков лекарственного средства. Просьба сообщать о нежелательных реакциях по адресу:

Российская Федерация

АО «ГЕНЕРИУМ»

601125, Владимирская обл., район Петушинский, п. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 273,
тел. +7 (49243) 72-5-20, 72-5-14Адрес электронной почты: generium@generium.ru

Врачам сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях:

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)<https://roszdravnadzor.gov.ru/>**Республиканское унитарное предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»**<https://www.rceth.by>

Вы можете также обратиться в АО «ГЕНЕРИУМ» в Отдел научной экспертизы и фармаконадзора и сообщить о нежелательных реакциях:

по телефону: +7-495-988-47-94

по адресу электронной почты: pv@generium.ruили обратиться на веб.страницу www.generium.ru.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы или пациент можете помочь получить больше информации о безопасности этого лекарственного препарата.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Общая характеристика лекарственного препарата Стимплейт®, ЛП-№(0003275) - (РГ-RU) от 11.12.2024.
2. Листок-вкладыш – информация для пациента по препарату Стимплейт®. ГРЛС, ЛП-№ (0003275) -(РГ-RU) от 11.12.2024.

АО «ГЕНЕРИУМ»Юридический адрес: 601125, Россия,
Владимирская обл., Петушинский район,
пос. Вольгинский, ул. Заводская, строение 273

Тел./факс: +7 (49243) 7 25 20

Московский офис: 123112, г. Москва,
ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2

Тел./факс: +7 (495) 988 47 94

info@generium.ru / www.generium.ru

Как рассчитать дозу препарата Стимплейт®

Пациенты с массой тела 6 кг - 22 кг

Объем, для которого **не** требуется дополнительное разведение

Масса тела (кг)	Доза (мкг/кг)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг

Общий объем инъекции (мл)
для введения индивидуальной дозы пациента

Пациенты с массой тела 6 кг - 22 кг

Объем **после** дополнительного разведения до 125 мкг/мл

Масса тела (кг)	Доза (мкг/кг)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг

Общий объем инъекции (мл)
для введения индивидуальной дозы пациента

При необходимости дополнительного разведения используйте правый блок ячеек, чтобы узнать общий объем инъекции препарата, разведенного до 125 мкг/мл. Пожалуйста, обратите внимание, что для использования калькулятора не требуется расчет индивидуальной дозы пациента.

Индивидуальная доза пациента (мкг) = исходная масса тела пациента (кг) × доза в мкг/кг

Объем инъекции в мл* = $\frac{\text{индивидуальная доза пациента (мкг)}}{500 \text{ мкг/мл**}}$



= Требуется дополнительное разведение



= Один флакон 250 мкг

*Округляйте значение объема до сотых долей миллилитра.

**Или 125 мкг/мл, если требуется дополнительное разведение.

Рекомендации по разведению

Флакон препарата Стимплейт® для однократного применения	Ввести указанный объем стерильного, не содержащего консерванты раствора натрия хлорида 9 мг/мл (0,9%) для инъекций во флакон с восстановленным раствором	Концентрация после разведения
250 мкг	2,25 мл	125 мкг/мл
500 мкг	3,75 мл	125 мкг/мл

ВВЕРХ

Пациенты с массой тела 6 кг - 22 кг
Объем, для которого не требуется дополнительное
разведение

6	*	*	*	0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.12
7	*	*	*	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13	0.14
8	*	*	*	0.05	0.06	0.08	0.10	0.11	0.13	0.16
9	*	*	*	0.05	0.07	0.09	0.11	0.13	0.14	0.18
10	*	*	*	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.20
11	*	*	*	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.18	0.22
12	*	*	*	0.05	0.07	0.10	0.12	0.14	0.17	0.22
13	*	*	*	0.05	0.08	0.10	0.13	0.16	0.18	0.26
14	*	*	*	0.06	0.08	0.11	0.14	0.17	0.20	0.28
15	*	*	*	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.21	0.30
16	*	*	*	0.06	0.10	0.13	0.16	0.19	0.22	0.32
17	*	*	*	0.07	0.10	0.14	0.17	0.20	0.24	0.34
18	*	*	*	0.07	0.11	0.14	0.18	0.22	0.25	0.36
19	*	*	*	0.08	0.11	0.15	0.19	0.23	0.27	0.38
20	*	*	*	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.40
21	*	*	*	0.08	0.13	0.17	0.21	0.25	0.29	0.42
22	*	*	*							

Пациенты с массой тела 6 кг - 22 кг
Объем после дополнительного разведения до 125 мкг/мл

6	0.05	0.10	0.14
7	0.06	0.11	0.17
8	0.06	0.13	
9	0.07	0.14	
10	0.08	0.16	
11	0.09	0.18	
12	0.10		
13	0.10		
14	0.11		
15	0.12		
16	0.13		
17	0.14		
18	0.14		
19	0.15		
20	0.16		
21	0.17		
22	0.18		

ВВЕРХ

Пациенты с массой тела 23 кг - 45 кг

23	0.05	0.09	0.14	0.18	0.23	0.28	0.32	0.37	0.41	0.46
24	0.05	0.10	0.14	0.19	0.24	0.29	0.34	0.38	0.43	0.48
25	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
26	0.05	0.10	0.16	0.21	0.26	0.31	0.36	0.42	0.47	0.52
27	0.05	0.11	0.16	0.22	0.27	0.32	0.38	0.43	0.49	0.54
28	0.06	0.11	0.17	0.22	0.28	0.34	0.39	0.45	0.50	0.56
29	0.06	0.12	0.17	0.23	0.29	0.35	0.41	0.46	0.52	0.58
30	0.06	0.12	0.18	0.24	0.30	0.36	0.42	0.48	0.54	0.60
31	0.06	0.12	0.19	0.25	0.31	0.37	0.43	0.50	0.56	0.62
32	0.06	0.13	0.19	0.26	0.32	0.38	0.45	0.51	0.58	0.64
33	0.07	0.13	0.20	0.26	0.33	0.40	0.46	0.53	0.59	0.66
34	0.07	0.14	0.20	0.27	0.34	0.41	0.48	0.54	0.61	0.68
35	0.07	0.14	0.21	0.28	0.35	0.42	0.49	0.56	0.63	0.70
36	0.07	0.14	0.22	0.29	0.36	0.43	0.50	0.58	0.65	0.72
37	0.07	0.15	0.22	0.30	0.37	0.44	0.52	0.59	0.67	0.74
38	0.08	0.15	0.23	0.30	0.38	0.46	0.53	0.61	0.68	0.76
39	0.08	0.16	0.23	0.31	0.39	0.47	0.55	0.62	0.70	0.78
40	0.08	0.16	0.24	0.32	0.40	0.48	0.56	0.64	0.72	0.80
41	0.08	0.16	0.25	0.33	0.41	0.49	0.57	0.66	0.74	0.82
42	0.08	0.17	0.25	0.34	0.42	0.50	0.59	0.67	0.76	0.84
43	0.09	0.17	0.26	0.34	0.43	0.52	0.60	0.69	0.77	0.86
44	0.09	0.18	0.26	0.35	0.44	0.53	0.62	0.70	0.79	0.88
45	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.81	0.90

Пациенты с массой тела 46 кг - 68 кг

46	0.09	0.18	0.28	0.37	0.46	0.55	0.64	0.74	0.83	0.92
47	0.09	0.19	0.28	0.38	0.47	0.56	0.66	0.75	0.85	0.94
48	0.10	0.19	0.29	0.38	0.48	0.58	0.67	0.77	0.86	0.96
49	0.10	0.20	0.29	0.39	0.49	0.59	0.69	0.78	0.88	0.98
50	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
51	0.10	0.20	0.31	0.41	0.51	0.61	0.71	0.82	0.92	1.02
52	0.10	0.21	0.31	0.42	0.52	0.62	0.73	0.83	0.94	1.04
53	0.11	0.21	0.32	0.42	0.53	0.64	0.74	0.85	0.95	1.06
54	0.11	0.22	0.32	0.43	0.54	0.65	0.76	0.86	0.97	1.08
55	0.11	0.22	0.33	0.44	0.55	0.66	0.77	0.88	0.99	1.10
56	0.11	0.22	0.34	0.45	0.56	0.67	0.78	0.90	1.01	1.12
57	0.11	0.23	0.34	0.46	0.57	0.68	0.80	0.91	1.03	1.14
58	0.12	0.23	0.35	0.46	0.58	0.70	0.81	0.93	1.04	1.16
59	0.12	0.24	0.35	0.47	0.59	0.71	0.83	0.94	1.06	1.18
60	0.12	0.24	0.36	0.48	0.60	0.72	0.84	0.96	1.08	1.20
61	0.12	0.24	0.37	0.49	0.61	0.73	0.85	0.98	1.10	1.22
62	0.12	0.25	0.37	0.50	0.62	0.74	0.87	0.99	1.12	1.24
63	0.13	0.25	0.38	0.50	0.63	0.76	0.88	1.01	1.13	1.26
64	0.13	0.26	0.38	0.51	0.64	0.77	0.90	1.02	1.15	1.28
65	0.13	0.26	0.39	0.52	0.65	0.78	0.91	1.04	1.17	1.30
66	0.13	0.26	0.40	0.53	0.66	0.79	0.92	1.06	1.19	1.32
67	0.13	0.27	0.40	0.54	0.67	0.80	0.94	1.07	1.21	1.34
68	0.14	0.27	0.41	0.54	0.68	0.82	0.95	1.09	1.22	1.36

FOLD

Как рассчитать дозу препарата Стимплейт®

Объемы инъекции для пациентов массой тела 23 кг и более не требуют дополнительного разведения

Пациенты с массой тела 23 кг - 45 кг

Пациенты с массой тела 46 кг - 68 кг

Масса тела (кг)	Доза (мкг/кг)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Общий объем инъекции (мл)
для введения индивидуальной дозы пациента

Масса тела (кг)	Доза (мкг/кг)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Общий объем инъекции (мл)
для введения индивидуальной дозы пациента

Индивидуальная доза пациента (мкг) = исходная масса тела пациента (кг) × доза в мкг/кг

Объем инъекции в мл* = $\frac{\text{индивидуальная доза пациента (мкг)}}{500 \text{ мкг/мл}}$

= Один флакон 250 мкг

= Два флакона 250 мкг

= Три флакона 250 мкг

*Округляйте значение объема до сотых долей миллилитра

FOLD and GLUE

FOLD and GLUE

Как рассчитать дозу препарата Стимплейт®

Объемы инъекции для пациентов массой тела 23 кг и более не требуют дополнительного разведения

Пациенты с массой тела 69 кг - 91 кг

Масса тела (кг)	Доза (мкг/кг)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг

Общий объем инъекции (мл)
для введения индивидуальной дозы пациента

Пациенты с массой тела 92 кг - 114 кг

Масса тела (кг)	Доза (мкг/кг)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг	мкг/кг

Общий объем инъекции (мл)
для введения индивидуальной дозы пациента

Индивидуальная доза пациента (мкг) = исходная масса тела пациента (кг) × доза в мкг/кг

$$\text{Объем инъекции в мл}^* = \frac{\text{индивидуальная доза пациента (мкг)}}{500 \text{ мкг/мл}}$$

☐ = Один флакон 250 мкг

☐ = Два флакона 250 мкг

☐ = Три флакона 250 мкг

☐ = Четыре флакона 250 мкг

☐ = Пять флаконов 250 мкг

*Округляйте значение объема до сотых долей миллилитра.

FOLD AND STUFF

Пациенты с массой тела 69 кг - 91 кг

69	0.14	0.28	0.41	0.55	0.69	0.83	0.97	1.10	1.24	1.38
70	0.14	0.28	0.42	0.56	0.70	0.84	0.98	1.12	1.26	1.40
71	0.14	0.28	0.43	0.57	0.71	0.85	0.99	1.14	1.28	1.42
72	0.14	0.29	0.43	0.58	0.72	0.86	1.01	1.15	1.30	1.44
73	0.15	0.29	0.44	0.58	0.73	0.88	1.02	1.17	1.31	1.46
74	0.15	0.30	0.44	0.59	0.74	0.89	1.04	1.18	1.33	1.48
75	0.15	0.30	0.45	0.60	0.75	0.90	1.05	1.20	1.35	1.50
76	0.15	0.30	0.46	0.61	0.76	0.91	1.06	1.22	1.37	1.52
77	0.15	0.31	0.46	0.62	0.77	0.92	1.08	1.23	1.39	1.54
	0.16	0.31	0.47	0.62	0.78	0.94	1.09	1.25	1.40	1.56
	0.16	0.32	0.47	0.63	0.79	0.95	1.11	1.26	1.42	1.58
	0.16	0.32	0.48	0.64	0.80	0.96	1.12	1.28	1.44	1.60
	0.16	0.32	0.49	0.65	0.81	0.97	1.13	1.30	1.46	1.62
82	0.16	0.33	0.49	0.66	0.82	0.98	1.15	1.31	1.48	1.64
83	0.17	0.33	0.50	0.66	0.83	1.00	1.16	1.33	1.49	1.66
84	0.17	0.34	0.50	0.67	0.84	1.01	1.18	1.34	1.51	1.68
85	0.17	0.34	0.51	0.68	0.85	1.02	1.19	1.36	1.53	1.70
86	0.17	0.34	0.52	0.69	0.86	1.03	1.20	1.38	1.55	1.72
87	0.17	0.35	0.52	0.70	0.87	1.04	1.22	1.39	1.57	1.74
88	0.18	0.35	0.53	0.70	0.88	1.06	1.23	1.41	1.58	1.76
89	0.18	0.36	0.53	0.71	0.89	1.07	1.25	1.42	1.60	1.78
90	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80
91	0.18	0.36	0.55	0.73	0.91	1.09	1.27	1.46	1.64	1.82

Пациенты с массой тела 92 кг - 114 кг

92	0.18	0.37	0.55	0.74	0.92	1.10	1.29	1.47	1.66	1.84
93	0.19	0.37	0.56	0.74	0.93	1.12	1.30	1.49	1.67	1.86
94	0.19	0.38	0.56	0.75	0.94	1.13	1.32	1.50	1.69	1.88
95	0.19	0.38	0.57	0.76	0.95	1.14	1.33	1.52	1.71	1.90
96	0.19	0.38	0.58	0.77	0.96	1.15	1.34	1.54	1.73	1.92
97	0.19	0.39	0.58	0.78	0.97	1.16	1.36	1.55	1.75	1.94
98	0.20	0.39	0.59	0.78	0.98	1.18	1.37	1.57	1.76	1.96
99	0.20	0.40	0.59	0.79	0.99	1.19	1.39	1.58	1.78	1.98
100	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
101	0.20	0.40	0.61	0.81	1.01	1.21	1.41	1.62	1.82	2.02
102	0.20	0.41	0.61	0.82	1.02	1.22	1.43	1.63	1.84	2.04
103	0.21	0.41	0.62	0.82	1.03	1.24	1.44	1.65	1.85	2.06
104	0.21	0.42	0.62	0.83	1.04	1.25	1.46	1.66	1.87	2.08
105	0.21	0.42	0.63	0.84	1.05	1.26	1.47	1.68	1.89	2.10
106	0.21	0.42	0.64	0.85	1.06	1.27	1.48	1.70	1.91	2.12
107	0.21	0.43	0.64	0.86	1.07	1.28	1.50	1.71	1.93	2.14
108	0.22	0.43	0.65	0.86	1.08	1.30	1.51	1.73	1.94	2.16
109	0.22	0.44	0.65	0.87	1.09	1.31	1.53	1.74	1.96	2.18
110	0.22	0.44	0.66	0.88	1.10	1.32	1.54	1.76	1.98	2.20
111	0.22	0.44	0.67	0.89	1.11	1.33	1.55	1.78	2.00	2.22
112	0.22	0.45	0.67	0.90	1.12	1.34	1.57	1.79	2.02	2.24
113	0.23	0.45	0.68	0.90	1.13	1.36	1.58	1.81	2.03	2.26
114	0.23	0.46	0.68	0.91	1.14	1.37	1.60	1.82	2.05	2.28

Пациенты с массой тела 115 кг - 137 кг

115	0.23	0.46	0.69	0.92	1.15	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30
116	0.23	0.46	0.70	0.93	1.16	1.39	1.62	1.86	2.09	2.32
117	0.23	0.47	0.70	0.94	1.17	1.40	1.64	1.87	2.11	2.34
118	0.24	0.47	0.71	0.94	1.18	1.42	1.65	1.89	2.12	2.36
119	0.24	0.48	0.71	0.95	1.19	1.43	1.67	1.90	2.14	2.38
120	0.24	0.48	0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.40
121	0.24	0.48	0.73	0.97	1.21	1.45	1.69	1.94	2.18	2.42
122	0.24	0.49	0.73	0.98	1.22	1.46	1.71	1.95	2.20	2.44
123	0.25	0.49	0.74	0.98	1.23	1.48	1.72	1.97	2.21	2.46
124	0.25	0.50	0.74	0.99	1.24	1.49	1.74	1.98	2.23	2.48
125	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
126	0.25	0.50	0.76	1.01	1.26	1.51	1.76	2.02	2.27	2.52
127	0.25	0.51	0.76	1.02	1.27	1.52	1.78	2.03	2.29	2.54
128	0.26	0.51	0.77	1.02	1.28	1.54	1.79	2.05	2.30	2.56
129	0.26	0.52	0.77	1.03	1.29	1.55	1.81	2.06	2.32	2.58
130	0.26	0.52	0.78	1.04	1.30	1.56	1.82	2.08	2.34	2.60
131	0.26	0.52	0.79	1.05	1.31	1.57	1.83	2.10	2.36	2.62
132	0.26	0.53	0.79	1.06	1.32	1.58	1.85	2.11	2.38	2.64
133	0.27	0.53	0.80	1.06	1.33	1.60	1.86	2.13	2.39	2.66
134	0.27	0.54	0.80	1.07	1.34	1.61	1.88	2.14	2.41	2.68
135	0.27	0.54	0.81	1.08	1.35	1.62	1.89	2.16	2.43	2.70
136	0.27	0.54	0.82	1.09	1.36	1.63	1.90	2.18	2.45	2.72
137	0.27	0.55	0.82	1.10	1.37	1.64	1.92	2.19	2.47	2.74

Пациенты с массой тела 138 кг - 150 кг

138	0.28	0.55	0.83	1.10	1.38	1.66	1.93	2.21	2.48	2.76
139	0.28	0.56	0.83	1.11	1.39	1.67	1.95	2.22	2.50	2.78
140	0.28	0.56	0.84	1.12	1.40	1.68	1.96	2.24	2.52	2.80
141	0.28	0.56	0.85	1.13	1.41	1.69	1.97	2.26	2.54	2.82
142	0.28	0.57	0.85	1.14	1.42	1.70	1.99	2.27	2.56	2.84
143	0.29	0.57	0.86	1.14	1.43	1.72	2.00	2.29	2.57	2.86
144	0.29	0.58	0.86	1.15	1.44	1.73	2.02	2.30	2.59	2.88
145	0.29	0.58	0.87	1.16	1.45	1.74	2.03	2.32	2.61	2.90
146	0.29	0.58	0.88	1.17	1.46	1.75	2.04	2.34	2.63	2.92
147	0.29	0.59	0.88	1.18	1.47	1.76	2.06	2.35	2.65	2.94
148	0.30	0.59	0.89	1.18	1.48	1.78	2.07	2.37	2.66	2.96
149	0.30	0.60	0.89	1.19	1.49	1.79	2.09	2.38	2.68	2.98
150	0.30	0.60	0.90	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	2.70	3.00

Как рассчитать дозу препарата Стимплейт®

Объемы инъекции для пациентов массой тела 23 кг и более не требуют дополнительного разведения

Пациенты с массой тела 115 кг - 137 кг

Масса тела (кг)	Доза (мкг/кг)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Общий объем инъекции (мл)
для введения индивидуальной дозы пациента

Пациенты с массой тела 138 кг - 150 кг

Масса тела (кг)	Доза (мкг/кг)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Общий объем инъекции (мл)
для введения индивидуальной дозы пациента

Индивидуальная доза пациента (мкг) = исходная масса тела пациента (кг) × доза в мкг/кг
индивидуальная доза пациента (мкг)

Объем инъекции в мл* = $\frac{\text{индивидуальная доза пациента (мкг)}}{500 \text{ мкг/мл}}$

*Округляйте значение объема до сотых долей миллилитра.

= Один флакон 250 мкг

= Два флакона 250 мкг

= Три флакона 250 мкг

= Четыре флакона 250 мкг

= Пять флаконов 250 мкг

= Шесть флаконов 250 мкг