

Риск развития рака

Препарат РАНВЭК потенциально может повысить риск развития рака, особенно рака кожи.

Сообщите своему врачу, если Вы заметите какие-либо изменения внешнего вида участка кожи или появление нового образования на коже.

Риск появления отверстий в кишечнике

Препарат РАНВЭК может увеличить риск появления отверстий в кишечнике, особенно если у Вас болезнь Крона.

Немедленно обратитесь к своему врачу, если у Вас возникла внезапная или необъяснимая боль в животе.

Показывайте эту памятку любому специалисту здравоохранения, оказывающему Вам медицинскую помощь, например, стоматологу или врачу скорой и неотложной помощи.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Материал подготовлен компанией AbbVie.
Контактные данные ООО «ЭббВи»: 125171, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш. Ленинградское, д. 16А, стр. 1, телефон: +7 (495) 258 42 77, электронная почта: pv.russia.cis@abbvie.com.

Настоящая Памятка пациента (локальная версия 2.0, разработанная на основе глобальной версии 5.0 от февраля 2025) подготовлена компанией AbbVie в рамках плана управления рисками препарата РАНВЭК и согласована с Росздравнадзором.

JAКа-RU-00937-E
Дата одобрения: сентябрь 2026

ФИО пациента:

ФИО врача, назначившего препарат РАНВЭК:

Номер телефона врача:

Дата начала приема препарата РАНВЭК:

Версия 5.0 от февраля 2025
¹Листок-вкладыш препарата РАНВЭК, 15 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой (регистрационное удостоверение ЛП-№(008990)-(ПГ-RU) от 21.02.2025): https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=dda2df88-975d-49f3-ac5b-9c6016c09297.
Дата обращения: 30.07.2026.

Памятка пациента

Постоянно храните эту памятку при себе (или у лица, осуществляющего уход)

Информация о безопасности препарата РАНВЭК (упадацитиниб) для пациентов

- Эта памятка содержит важную информацию о безопасности, которую Вам следует знать до и во время лечения препаратом РАНВЭК.
- Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с листком-вкладышем препарата РАНВЭК¹.

Риск развития инфекций

Препарат РАНВЭК может ухудшить течение уже имеющейся инфекции или увеличить вероятность возникновения новой инфекции, например, туберкулеза, опоясывающего герпеса или вирусного гепатита.

Немедленно сообщите своему врачу, если Вы заметили признаки инфекции, такие как:

- лихорадка, потливость, озноб, потеря веса или кашель, который не исчезает — это могут быть признаки туберкулеза;
- болезненная кожная сыпь с волдырями — это может быть признаком опоясывающего герпеса;
- чувство усталости или одышка — это могут быть симптомы пневмонии.

Сообщите своему врачу, если:

- Вам недавно диагностировали туберкулез или Вы когда-либо болели туберкулезом;
- Вы недавно находились в тесном контакте с человеком, больным туберкулезом.

Вакцины для профилактики инфекций

Живые вакцины (например, вакцина против гриппа в форме назального спрея, против ветряной оспы, кори/эпидемического паротита/краснухи) не следует применять во время лечения препаратом РАНВЭК или непосредственно перед началом приема препарата РАНВЭК.

Прежде чем вакцинироваться, проконсультируйтесь со своим врачом — ему должно быть известно, какие вакцины Вам не следует применять до или во время лечения препаратом РАНВЭК.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний

Прием препарата РАНВЭК может привести к увеличению уровня холестерина в крови. Ваш врач будет проверять уровень холестерина, пока Вы принимаете препарат РАНВЭК.

Немедленно сообщите своему врачу, если Вы заметили такие признаки, как боль или стеснение в груди, так как это может быть симптомом заболевания сердечно-сосудистой системы.

Контрацепция, беременность и грудное вскармливание

Препарат РАНВЭК нельзя принимать во время беременности.

- Используйте эффективные методы контрацепции

во время лечения препаратом РАНВЭК и в течение 4 недель после приема последней дозы. Проконсультируйтесь со своим врачом относительно эффективных методов контрацепции.

- Если Вы планируете беременность или забеременели, немедленно сообщите об этом своему врачу.
- Не кормите грудью в период лечения препаратом РАНВЭК.

Риск образования тромбов в венах или легких

При применении препарата РАНВЭК наблюдались случаи образования тромбов в венах или легких. Немедленно сообщите своему врачу, если Вы заметили признаки образования тромбов в венах или легких, такие как болезненная отечность ног, одышка или боль в груди.