

Ваш путеводитель по Эйлеа®

Данная брошюра предназначена для людей, которым назначен препарат Эйлеа® (раствор афлиберцепта для инъекций)




40 мг/мл



114,3 мг/мл

Препарат Эйлеа® используется для лечения ухудшения зрения, вызванного макулярным отеком вследствие окклюзии вен сетчатки (ОВС) (окклюзия центральной вены, ее ветвей, гемиретинальная окклюзия)

Доза Эйлеа® 2 мг и доза Эйлеа® 8 мг были изучены при ОЦВС и ОВЦВС. Ваш врач может назначить вам дозу Эйлеа® 2 мг (40 мг/мл) или Эйлеа® 8 мг (114,3 мг/мл), в зависимости от вашей ситуации



Материал подготовлен в рамках мер по минимизации рисков и не является рекламным материалом. Материал одобрен Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.



Добро пожаловать в ваш путеводитель по Эйлеа®



Ваш врач назначил препарат Эйлеа®, потому что вам поставили диагноз окклюзия вены сетчатки, который может проявляться в виде окклюзии центральной вены сетчатки (ОЦВС) или окклюзии ветви центральной вены сетчатки (ОВЦВС).

Это заболевание, из-за которого вы хуже видите.

Такие процедуры, как введение Эйлеа®, могут помочь предотвратить ухудшение вашего зрения и улучшить некоторые из имеющихся у вас симптомов.

Эта брошюра была создана с целью помочь ответить на любые ваши вопросы, чтобы вы могли получить от лечения максимальную пользу.

Ваша офтальмологическая клиника:

Контакт: _____

Телефон: _____

Адрес: _____

Электронная почта: _____



В ЭТОЙ КНИГЕ ВЫ НАЙДЕТЕ:

Информацию, которая поможет вам понять ОВС

- Что такое ОЦВС и ОВЦВС?
- Причины развития ОЦВС и ОВЦВС?
- Советы по образу жизни при ОВС

Чего можно ожидать от лечения Эйлеа®

- Что такое Эйлеа®?
- Как я буду получать лечение Эйлеа®?
- Что делать, если у меня есть вопросы об Эйлеа®?

Забота о глазах после инъекции Эйлеа®

- Чего мне ожидать?
- Когда мне нужно снова принимать Эйлеа®?
- Есть ли побочные эффекты у Эйлеа®?

В данной брошюре также указаны другие источники полезной информации о вашем заболевании, и приложен календарь, чтобы помочь вам отслеживать даты получения инъекций Эйлеа®.




Что такое ОЦВС и ОВЦВС?

В задней части вашего глаза находится сеть переплетенных клеток и сосудов, которые создают барьер, контролирующий поступление различных веществ в сетчатку.

Сетчатка — это место, где фиксируются все изображения, которые вы видите, она действует как пленка в фотоаппарате.

Окклюзия центральной вены сетчатки (ОЦВС) — это состояние, при котором нарушается зрение из-за блокирования кровотока в сетчатке в задней части глаза.

Блокада останавливает приток крови к сетчатке и из нее, что может повредить зрение и в итоге привести к слепоте и болезненным ощущениям в глазах.



У людей с окклюзией ветви центральной вены сетчатки (ОВЦВС) происходит блокада одной или нескольких ветвей сосудов, транспортирующих кровь от сетчатки. Через них может просачиваться жидкость, вызывая отек. Макула — это участок сетчатки, отвечающий за четкое центральное зрение. Повышенная проницаемость сосудов и накопление жидкости в зоне макулы могут привести к ухудшению и размытости центрального зрения и, с течением времени, к образованию рубцов. Подобно царапинам на фотографии, эти рубцы мешают вам видеть все, что вам нужно.

Причины развития ОЦВС и ОВЦВС?

У многих людей с ОЦВС и ОВЦВС конкретная причина развития этого состояния может быть не определена, но часто это происходит как следствие других состояний, таких как глаукома, атеросклероз (уплотнение артерий), гипертония (высокое кровяное давление) или сахарный диабет.

Окклюзия центральной вены сетчатки может произойти в любом возрасте, но чаще встречается у людей старше 65 лет.

Другие факторы, которые могут увеличить риск развития ОЦВС и ОВЦВС или ухудшить состояние — это факторы «образа жизни», включая курение и избыточный вес. Отказ от курения значительно снижает риск поражения глаз, а также улучшает общее состояние здоровья. Если у вас избыточный вес, похудение и здоровое питание могут помочь защитить ваше зрение. Ваш терапевт может дать вам рекомендации в отношении отказа от курения и снижения веса. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы защитить свое зрение — это следовать советам офтальмолога и соблюдать запланированный график приемов.

Как лечится ОЦВС и ОВЦВС?

Есть несколько вариантов лечения ОЦВС и ОВЦВС, и они работают по-разному.

При ОЦВС варианты лечения направлены на «склеивание» и сокращение слабых кровеносных сосудов, чтобы предотвратить их закупорку. Другие методы лечения направлены на уменьшение отека и облегчение боли.

При ОВЦВС лечение направлено на «склеивание» и сокращение сосудов, из которых просачивается жидкость. Методы лечения могут включать в себя интравитреальные инъекции и лазерную коагуляцию.

Поскольку нет двух одинаковых людей, универсального лечения ОВС не существует. Врач подберет терапию, в наибольшей степени подходящую вашим индивидуальным потребностям.



Что такое Эйлеа®?

Лечение препаратом Эйлеа® направлено на подавление фактора роста эндотелия сосудов. Эйлеа® блокирует данный белок, который стимулирует развитие слабых, патологических кровеносных сосудов в глазу. Это помогает уменьшить просачивание жидкости в сетчатку глаза.

Эйлеа® — это лекарственный раствор, который вводится в глаз посредством инъекции. Мысли о проведении инъекции в глаз могут вызывать объяснимое беспокойство, однако большинство пациентов, проходящих курс лечения Эйлеа®, говорят, что инъекция безболезненна, и на словах процесс звучит хуже, чем он есть на самом деле.



40 мг/мл



114,3 мг/мл



Для кого предназначен препарат Эйлеа®?



Эйлеа® предназначен для людей, которым поставили диагноз ОВС – ОЦВС или ОВЦВС

Перед началом лечения Эйлеа® обязательно сообщите своему врачу или медсестре, если:

- Вы знаете, что у Вас **есть инфекция в глазу** или вокруг него
- Если у вас в настоящее время есть **покраснение глаза** или вы испытываете боль в глазу
- Вы думаете, что у вас может быть **аллергия на йод**, какие-либо обезболивающие или любой из компонентов Эйлеа®
- У вас были сложности или **проблемы с инъекциями** в глаз раньше
- У вас есть **глаукома или высокое внутриглазное давление** (сейчас или в прошлом)
- **Вы видите вспышки света** или «плавающие объекты» в поле зрения (сейчас или в прошлом)
- **Вы принимаете какие-либо лекарства** по рецепту или без него
- Вы перенесли или у вас планируется **операция на глазах** в течение четырех недель до или после лечения Эйлеа®
- **Вы беременны, планируете беременность или кормите грудью.**
Информации о безопасности применения Эйлеа® у беременных женщин очень мало. Эйлеа® 2 мг и Эйлеа® 8 мг не следует применять во время беременности, за исключением случаев, когда польза превышает риск для плода. Обсудите это со своим врачом перед лечением Эйлеа®. Женщины детородного возраста должны использовать эффективные противозачаточные средства во время лечения препаратом Эйлеа®. Если вы получаете лечение Эйлеа® в дозе 2 мг, вам следует продолжить использовать эффективные средства контрацепции в течение, как минимум, трех месяцев после последней инъекции Эйлеа®. Если вы получаете лечение Эйлеа® в дозе 8 мг, вам следует продолжить использовать эффективные средства контрацепции в течение, как минимум, четырех месяцев после последней инъекции Эйлеа®. Небольшое количество Эйлеа® может попасть в грудное молоко. Влияние афлиберцепта на новорожденного и младенца, находящегося на грудном вскармливании, неизвестно.

Примечание: Эйлеа® не рекомендуется во время грудного вскармливания.



Как я могу подготовиться к инъекции Эйлеа®?

Ваш лечащий врач может попросить вас использовать определенные глазные капли за несколько дней до введения Эйлеа®. После инъекции ваше зрение может быть нечетким, поэтому вам не следует самостоятельно вести машину по дороге домой. Запланируйте, чтобы друг или член семьи отвез вас на прием, или выясните, как добраться в клинику и вернуться домой другим способом. В день приема не наносите макияж.

Чего следует ожидать перед и во время введения инъекции Эйлеа®?

- 1** Ваш врач или медсестра подготовит вас к введению инъекции Эйлеа®. Эти люди – высококвалифицированные специалисты с опытом лечения ОВС. Они понимают, что процедура может вызывать беспокойство, и позаботятся о том, чтобы вы расслабились и чувствовали себя комфортно.
- 2** Вам закапают глазные капли, которые действуют как местное обезболивающее, и промоют глаза и кожу вокруг них. Ваше лицо будет накрыто специальной салфеткой, а глаз будет зафиксирован открытым. Глазные капли будут размывать ваше зрение, поэтому вы не увидите иглу.
- 3** Опытный врач сделает инъекцию в белок вашего глаза. Большинство людей отмечают, что инъекция безболезненна, а некоторые говорят, что чувствуют только легкое давление. Вся процедура может показаться немного дискомфортной, но она займет всего несколько минут.



Что делать, если у меня остались сомнения или вопросы?

Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы, лучше всего поговорить с вашим лечащим врачом. Он обладает колоссальным опытом и знает вашу индивидуальную ситуацию, поэтому сможет дать вам необходимые ответы.

Не стесняйтесь задавать вопросы или выражать свои опасения. Ваш врач может дать вам ответы и подбодрить вас.

Чего я могу ожидать после введения инъекции Эйлеа®?

- 1** После инъекции врач может назначить вам некоторые диагностические процедуры - например, измерение внутриглазного давления. После инъекции ваше зрение может быть размытым, поэтому вам не следует водить машину до тех пор, пока оно не вернется в норму.
- 2** В течение нескольких следующих дней у вас может появиться покраснение глаза или движущиеся пятна, мушки в поле зрения. Оба явления должны исчезнуть в течение нескольких дней – если они не исчезнут или ухудшатся, вам следует обратиться к лечащему врачу.
- 3** Некоторые люди могут чувствовать небольшую боль или дискомфорт в глазу после инъекции. Если это состояние не проходит или ухудшается, вам также следует обратиться к лечащему врачу.

Когда мне нужно прийти на следующий прием к врачу?

Врач составит для вас график инъекций Эйлеа® с учетом ваших индивидуальных потребностей

Помните, что ваш лечащий врач – наиболее надежный источник информации о вашем состоянии, и все возникающие вопросы по поводу вашего лечения лучше адресовать именно ему.

Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом-офтальмологом, прежде чем прекратить лечение Эйлеа®.



**Когда вам назначат очередной прием,
не забудьте записать его дату
в календарь на задней обложке брошюры
в качестве напоминания**



Есть ли нежелательные реакции у Эйлеа®?

Как и любое лекарство, отпускаемое по рецепту или без рецепта, Эйлеа® может вызывать нежелательные реакции. При этом не все пациенты, получающие Эйлеа®, испытывают их.

Нежелательные реакции могут включать:

- **Внутриглазное воспаление:** боль в глазах или повышенный дискомфорт. Покраснение глаз, чувствительность к свету, отек и изменения зрения, такие как внезапное ухудшение или его нечеткость.
- **Помутнение хрусталика (катаракта):** видение теней объектов, менее четкое видение линий и форм предметов, ухудшение яркости восприятия цвета.
- **Повышение внутриглазного давления:** видение ореолов вокруг источников света. Покраснение глаза, тошнота, рвота и изменения зрения.
- **Разрыв или отслоение части сетчатки:** внезапные вспышки света, внезапное появление или увеличение числа мушек перед глазами, эффект завесы над частью поля зрения, изменение зрения.



Немедленно обратитесь к своему лечащему врачу, если вы считаете, что у вас наблюдается какая-либо из этих нежелательных реакций



Жизнь с ОВС

Диагноз ОВС и проблемы со зрением могут вызывать тревогу. Испытывать беспокойство и неуверенность в своем будущем естественно, однако ваш диагноз не означает, что вы больше не сможете жить полноценной жизнью. Вы можете продолжать наслаждаться общением с семьей, друзьями и заниматься своими увлечениями при помощи небольших изменений.

Некоторые из следующих советов могут быть для вас полезны:

- Сообщите друзьям и семье, что у вас ОВС, и объясните, как это влияет на ваше зрение
- Используйте более яркое освещение
- Организуйте пространство таким образом, чтобы у каждого предмета было свое место
- Носите и используйте фонарик и увеличительное стекло
- Читайте книги и газеты с крупным шрифтом, также попробуйте слушать аудиокниги

Поддержка людей с ОВС

Где бы вы ни находились и как бы сильно вы ни страдали от ОВС, важно помнить, что вы не одиноки. Возможно, сейчас вам трудно понять свой диагноз или смириться с ним. Если у вас есть вопросы относительно вашего заболевания, то вы можете обратиться за помощью к специалистам, которые могут ответить на них. Общение с людьми, находящимися или бывшими в подобной ситуации, может помочь принять ваш диагноз.



Краткая инструкция к препарату

ЭЙЛЕА® 2 мг	Наименование лекарственного препарата: Эйлеа®, 40 мг/мл, раствор для внутриглазного введения.		
	Международное непатентованное наименование: Афлиберцепт / Aflibercept.		
Показания к применению:	Препарат Эйлеа показан к применению у взрослых с 18 лет: • для лечения неоваскулярной («влажной») формы возрастной макулярной дегенерации («влажной» формы ВМД); • для лечения ухудшения зрения, вызванного макулярным отеком вследствие окклюзии вен сетчатки (центральной вены (ОЦВС) или ее ветвей (ОВЦВС)); • для лечения ухудшения зрения, вызванного диабетическим макулярным отеком (ДМО); • для лечения ухудшения зрения, вызванного миопической хориоидальной неоваскуляризацией (миопической ХНВ).		
Режим дозирования и способ применения:	Препарат Эйлеа® предназначен только для введения в стекловидное тело. Содержимое флакона следует использовать только для одной инъекции. Препарат Эйлеа® должен вводить только врач, имеющий соответствующую квалификацию и опыт интравитреальных инъекций. Рекомендованная доза препарата Эйлеа® составляет 2 мг афлиберцепта, что эквивалентно 50 мкл (0,05 мл) раствора. Подробная информация о способе применения и дозах, а также о частоте инъекций содержится в общей характеристике препарата Эйлеа®.		
Противопоказания:	• Гиперчувствительность к афлиберцепту или к любому из вспомогательных веществ. • Активная или подозреваемая интра- или периокулярная инфекция. • Активное тяжелое внутриглазное воспаление. • Возраст до 18 лет.		
Особые указания и меры предосторожности при применении:	При лечении пациентов с плохо контролируемой глаукомой (не следует вводить препарат Эйлеа® при внутриглазном давлении ≥ 30 мм рт. ст.); у пациентов, перенесших инсульт, транзиторную ишемическую атаку или инфаркт миокарда в течение последних 6 месяцев (при лечении ОЦВС, ОВЦВС, ДМО или миопической ХНВ); у пациентов с факторами риска нарушения целостности пигментного эпителия сетчатки.		
Нежелательные реакции*	Наиболее распространенные нежелательные реакции включали субконъюнктивальное кровоизлияние, снижение остроты зрения, кровоизлияние в сетчатку, боль в глазу, катаракту, повышение внутриглазного давления, отслойку стекловидного тела и плавающие помутнения стекловидного тела. Часто: разрыв пигментного эпителия сетчатки*, отслойка пигментного эпителия сетчатки, дегенерация сетчатки, кровоизлияния в стекловидное тело, кортикальная катаракта, ядерная катаракта, субкапсулярная катаракта, эрозия роговицы, микроэрозии роговицы, затуманивание зрения, боль в месте введения, чувство инородного тела в глазу, слезотечение, отек века, кровоизлияния в месте введения, точечный кератит, инъекция конъюнктивы век, инъекция конъюнктивы глазного яблока. *Состояния, связанные, как известно, с «влажной» формой ВМД. Наблюдались только в исследованиях с «влажной» формой ВМД.		
Регистрационный номер:	ЛП-№(006553)-(PF-RU)	Актуальная версия инструкции	от 15.01.2026
Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:	Байер АГ, Леверкузен, Германия	Производитель (Выпускающий контроль качества):	Байер АГ, Берлин, Германия.
Эйлеа® 2 мг является разовой рекомендуемой дозой. Дозировка препарата Эйлеа® 2 мг составляет 40 мг/мл. Отпускается по рецепту. Подробная информация содержится в общей характеристике лекарственного препарата.			

Краткая инструкция к препарату

ЭЙЛЕА® 8 мг	Наименование лекарственного препарата: Эйлеа®, 114,3 мг/мл, раствор для внутриглазного введения.		
	Международное непатентованное наименование: Афлиберцепт / Aflibercept.		
Показания к применению:	Препарат Эйлеа® показан к применению у взрослых для лечения: • неоваскулярной («влажной») формы возрастной макулярной дегенерации (нВМД); • ухудшения зрения, вызванного диабетическим макулярным отеком (ДМО). • ухудшения зрения, вызванного макулярным отеком вследствие окклюзии вен сетчатки (ОВС) (окклюзия центральной вены, ее ветвей, гемиретинальная окклюзия).		
Режим дозирования и способ применения:	Неоваскулярная («влажная») форма возрастной макулярной дегенерации (нВМД) и диабетический макулярный отек (ДМО). Рекомендованная доза составляет 8 мг афлиберцепта, что эквивалентно 0,07 мл раствора. Режим дозирования по показаниям нВМД, ДМО одинаковый. Для получения дозы 8 мг необходимо использовать препарат Эйлеа® 114,3 мг/мл. Пациентам, которые начинают лечение, вводят три последовательных ежемесячных инъекции препарата Эйлеа®. Затем интервалы между инъекциями могут быть увеличены до 4 месяцев на основании оценки результатов изменения остроты зрения и/или анатомических показателей лечащим врачом. Впоследствии интервалы между инъекциями могут быть увеличены до 6 месяцев, например, в режиме «лечить и увеличивать интервал», при условии поддержания стабильных результатов по остроте зрения и/или анатомическим показателям. Окклюзия вен сетчатки (ОВС). Рекомендованная доза составляет 8 мг афлиберцепта, что эквивалентно 0,07 мл раствора. Для получения дозы 8 мг необходимо использовать препарат Эйлеа® 114,3 мг/мл. Пациентам, которые начинают лечение, вводят три последовательных ежемесячных инъекции препарата Эйлеа®. Затем интервалы между инъекциями могут быть увеличены на основании оценки результатов изменения остроты зрения и/или анатомических показателей лечащим врачом. Неоваскулярная («влажная») форма возрастной макулярной дегенерации (нВМД), диабетический макулярный отек (ДМО) и окклюзия вен сетчатки (ОВС). Для пациентов, которые ранее получали лечение препаратом Эйлеа® 40 мг/мл или другими анти-VEGF препаратами и переводятся на препарат Эйлеа® 114,3 мг/мл, схема лечения может отличаться от той, которая используется для пациентов, которые не получали лечение ранее. Интервалы между инъекциями должны определяться на основании результатов по остроте зрения и/или анатомическим показателям. • У пациентов со стабильными результатами по остроте зрения и анатомическим показателям предыдущие интервалы между инъекциями могут быть сохранены или увеличены после первой инъекции препарата Эйлеа® 114,3 мг/мл, например, в режиме «лечить и увеличивать интервал». • У пациентов с недостаточными результатами по остроте зрения и/или анатомическим показателям лечение препаратом Эйлеа® 114,3 мг/мл может начинаться с трех последовательных ежемесячных инъекций, после чего интервалы между инъекциями индивидуализируются, например, в режиме «лечить и увеличивать интервал». Если результаты по остроте зрения и/или анатомическим показателям ухудшаются, следует сократить интервалы между инъекциями соответствующим образом по усмотрению врача. Интервал между двумя инъекциями должен составлять не менее 1 месяца. Если результаты по остроте зрения и/или анатомическим показателям указывают на отсутствие эффекта от проводимого лечения у пациента, терапию препаратом Эйлеа® 114,3 мг/мл следует прекратить. Препарат Эйлеа® предназначен только для внутриглазного введения. Интравитреальные инъекции должны проводиться в соответствии с медицинскими стандартами и действующими рекомендациями квалифицированным врачом, имеющим опыт проведения таких инъекций.		
Противопоказания:	• Гиперчувствительность к афлиберцепту или к любому из вспомогательных веществ. • Глазная или периокулярная инфекция. • Активное тяжелое внутриглазное воспаление.		
Особые указания и меры предосторожности при применении:	При лечении пациентов с плохо контролируемой глаукомой (не следует вводить препарат Эйлеа® при внутриглазном давлении ≥ 30 мм рт. ст.); у пациентов, перенесших инсульт, транзиторную ишемическую атаку или инфаркт миокарда в течение последних 6 месяцев (при лечении нВМД, ДМО и ОВС); у пациентов с факторами риска образования разрывов пигментного эпителия сетчатки.		
Нежелательные реакции*	Серьезные нежелательные реакции включали катаракту (7,1%), повышение внутриглазного давления (3,8%), кровотечение в сетчатку (2,8%), кровоизлияние в стекловидное тело (1,1%), катаракту субкапсулярную (0,6%), разрыв сетчатки (0,5%), катаракту ядерную (0,4 %) и отслоение сетчатки (0,4 %). Наиболее распространенные нежелательные реакции у пациентов, получавших терапию препаратом Эйлеа® 114,3 мг/мл, включали катаракту (7,1 %), уменьшение остроты зрения (4,3 %), кровотечение в конъюнктиву (4,0 %), повышение внутриглазного давления (3,8 %), отслойку стекловидного тела (3,5 %), отложение в стекловидном теле (3,2 %), кровотечение в сетчатку (2,8 %). Профиль безопасности, наблюдавшийся в 4 клинических исследованиях, был сопоставимым у пациентов, получавших препарат Эйлеа® 114,3 мг/мл (N=1808) и препарат Эйлеа® 40 мг/мл (N=857), а также у пациентов с нВМД, ДМО и ОВС.		
Регистрационный номер:	ЛП-№(010287)-(РГ-RU)	Актуальная версия инструкции:	от 26.06.2026
Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:	Байер АГ, Леверкузен, Германия	Производитель (Выпускающий контроль качества):	Байер АГ, Берлин, Германия.

Эйлеа® 8 мг является разовой рекомендуемой дозой. Дозировка препарата Эйлеа® 8 мг составляет 114,3 мг/мл. Отпускается по рецепту. Подробная информация содержится в общей характеристике лекарственного препарата.

Если Вы хотите сообщить о нежелательном явлении, возникшем на фоне применения Эйлеа® (афлиберцепт), пожалуйста, передайте информацию своему лечащему врачу, в регуляторные органы или в АО «БАЙЕР», 107113, Россия, Москва, ул. 3-я Рыбинская д.18, стр.2. Тел.: +7 (495) 234 20 00. +7 495 231 1200 (в рабочее время).

Календарь / карточка встречи

№ инъекции	Запланированная дата и время	Примечания
1-ая инъекция		
2-ая инъекция		
3-ая инъекция		
4-ая инъекция		
5-ая инъекция		
6-ая инъекция		
7-ая инъекция		
8-ая инъекция		
9-ая инъекция		
10-ая инъекция		
11-ая инъекция		
12-ая инъекция		