

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Эликвис (апиксабан)

Всегда носите с собой эту памятку!

Покажите эту памятку фармацевту, стоматологу и любому другому медицинскому работнику, который оказывает Вам медицинскую помощь.

Я получаю лечение антикоагулянтом Эликвис (апиксабан), чтобы не допустить образования тромбов.

Просим Вас заполнить этот раздел или попросить об этом Вашего врача

Имя:

Дата рождения:

Показание к применению:

Доза: ____ мг 2 раза в сутки

Имя врача:

Телефон врача:

Информация для пациентов

- Принимайте препарат Эликвис регулярно в соответствии с инструкцией по медицинскому применению. Если Вы пропустите утреннюю дозу, примите ее сразу, как только вспомните о пропуске, и ее можно принять одновременно с вечерней дозой. Пропущенную вечернюю дозу можно принять только в течение вечера того же дня. Не следует принимать две дозы на следующее утро, вместо этого на следующий день продолжайте лечение по обычной схеме 2 раза в сутки.
- Не прекращайте прием препарата Эликвис без предварительной консультации с врачом, поскольку для Вас существует риск развития инсульта или других осложнений.
- Препарат Эликвис помогает разжижать кровь. Однако при этом может повыситься риск кровотечения.
- Признаками и симптомами кровотечения могут быть синяки или подкожные гематомы, дегтеобразный стул, кровь в моче, носовое кровотечение, головокружение, утомляемость, бледность или слабость, внезапная сильная головная боль, кровохаркание или рвота с кровью.
- Если кровотечение не останавливается самостоятельно, **немедленно обратитесь за медицинской помощью.**
- Если Вам требуется хирургическое вмешательство или любая инвазивная процедура, сообщите Вашему врачу о том, что Вы принимаете препарат Эликвис.

Информация для медицинских работников здравоохранения

- Препарат Эликвис (апиксабан) – это пероральный антикоагулянт, действующий прямым селективным ингибированием фактора Ха.
- Препарат Эликвис может повышать риск кровотечения. В случае больших кровотечений прием препарата следует сразу же прекратить.
- При лечении препаратом Эликвис постоянный мониторинг экспозиции не требуется. В исключительных ситуациях, например, в случае передозировки или неотложного хирургического вмешательства, может быть использован набор для калиброванного количественного анализа анти-Ха активности (в таких ситуациях не рекомендуется оценивать свертываемость крови по протромбиновому времени (ПТВ), международному нормализованному отношению (МНО) или активированному частичному тромбопластиновому времени (АЧТВ) – см. Общую характеристику лекарственного препарата (ОХЛП) Эликвис.
- Существует препарат, способный нейтрализовать анти-Ха-факторную активность апиксабана.