КАРТА-ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

АПИКСАБАН ГЕДЕОН РИХТЕР (апиксабан),

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Всегда носите эту памятку с собой.

Предъявляйте памятку каждому врачу, стоматологу и любому другому медицинскому работнику, который оказывает Вам медицинскую помощь, до начала лечения.

Я получаю антикоагулянтную терапию препаратом Апиксабан Гедеон Рихтер (апиксабан) для предотвращения образования тромбов.

Пожалуйста, заполните этот раздел или попросите своего лечащего врача сделать это

Имя: _____

Дата рождения: _____

Показание к применению:

Доза: _____ мг два раза в сутки

Имя врача: _____

Телефон врача: _____

Информация для пациентов

- Регулярно принимайте препарат Апиксабан Гедеон Рихтер в дозе, которую назначил Вам врач.
- Если Вы пропустили прием препарата утром, примите пропущенную дозу сразу, как только вспомните; утреннюю дозу можно принять вместе с вечерней. Пропущенную вечернюю дозу можно принять только вечером того же дня. Не принимайте двойную дозу утром следующего дня. На следующий день продолжайте прием препарата в обычном режиме, два раза в сутки, в соответствии с рекомендациями врача.
- Не прекращайте принимать препарат Апиксабан Гедеон Рихтер, не посоветовавшись со своим врачом, так как существует риск развития инсульта или других осложнений.
- Апиксабан Гедеон Рихтер помогает разжижать Вашу кровь. Однако это может увеличить риск возникновения кровотечения.
- Признаки и симптомы кровотечения включают кровоподтеки или подкожные кровоизлияния, стул черного цвета, наличие крови в моче, носовое кровотечение, головокружение, усталость, бледность или слабость, внезапную сильную головную боль, кашель с кровью или рвоту кровью.
- Если кровотечение не останавливается самостоятельно, **немедленно обратитесь за медицинской помощью.**
- Если Вам предстоит хирургическое вмешательство или любая инвазивная процедура, сообщите своему врачу, что Вы принимаете препарат Апиксабан Гедеон Рихтер.

Информация для медицинских работников

- Препарат Апиксабан Гедеон Рихтер (апиксабан) — пероральное антитромботическое средство, прямой ингибитор фактора Ха.
- При применении препарата Апиксабан Гедеон Рихтер возможно повышение риска кровотечения. В случае развития массивного кровотечения следует немедленно прекратить прием препарата.
- Терапия препаратом Апиксабан Гедеон Рихтер не требует постоянного мониторинга концентрации апиксабана в крови. Калиброванный количественный анализ анти-Ха-факторной активности может быть целесообразен в исключительных ситуациях, например, при передозировке и неотложном хирургическом вмешательстве (определение следующих

Номер версии: 1.0
Дата: май 2023 г.

лабораторных показателей свертываемости крови: протромбиновое время (ПТВ), международное нормализованное отношение (МНО) и активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) не рекомендуется) - см. ОХЛП.

- Доступно средство, снижающее активность апиксабана в отношении фактора Ха.